

A monitor rendszerben 2016. évben jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacin	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	31,4	27,7	16,4	18,1	30,8	60,9	39,3	20,0
Mérsékelt (%)	0,7	3,0	-	0,2	0,6	-	-	0,8
Rezisztens (%)	67,9	69,3	83,6	81,7	68,6	39,1	60,7	79,2
Törzs (beteg)	3629	3907	3894	2588	3900	3868	3674	2775
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	90,3	89,3	79,4	80,4	89,4	86,7	87,9	75,7
Mérsékelt (%)	1,1	1,8	-	0,7	0,0	-	-	0,6
Rezisztens (%)	8,6	8,9	20,6	18,9	10,6	13,3	12,1	23,7
Törzs (beteg)	373	394	398	275	395	391	380	342
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	94,0	92,3	86,5	87,3	90,6	88,5	87,9	84,0
Mérsékelt (%)	0,9	1,7	-	0,6	-	-	1,9	0,4
Rezisztens (%)	5,1	6,0	13,5	12,1	9,4	11,5	10,2	15,6
Törzs (beteg)	1340	1471	1338	1091	1475	1445	1311	1279