

A monitor rendszerben 2019. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

Járóbeteg mintákból izolált törzsek																		
Érzékeny (%)	14,0	88,3	92,2	92,6	98,9	96,5	96,4	73,4	75,2	100,0	99,9	99,3	93,3	99,9	99,0	99,5	99,9	99,6
Maximális dózissra érzékeny (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	86,0	11,7	7,8	7,4	1,1	3,5	3,5	26,6	24,8	0,0	0,1	0,7	6,7	0,1	1,0	0,5	0,1	0,4
Törzs (beteg)	9834	23046	21199	18807	24058	10421	6838	22621	23968	8280	6230	11614	14814	4761	5157	23714	10940	3270

Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek																		
Érzékeny (%)	11,5	78,3	79,7	80,9	98,1	95,6	96,5	71,5	71,6	100,0	100,0	98,1	92,8	99,9	99,4	99,1	99,9	99,5
Maximális dózissra érzékeny (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	88,5	21,7	20,3	19,1	1,9	4,4	3,3	28,5	28,4	0,0	0,0	1,9	7,2	0,1	0,6	0,9	0,1	0,5
Törzs (beteg)	10787	18501	17100	13769	19482	11706	9030	17635	19385	8950	5467	11903	14431	5413	5988	19004	10586	2748