

A monitor rendszerben 2012. évben jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacin	Gentamicin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Quinupristin\ dalifopristin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim
--------------	------------	-----------	---------------	--------------	------------	----------	--------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	--------------------------------	-----------	-----------	------------

Járóbeteg mintákból izolált törzsek

Érzékeny (%)	10,1	92,2	92,0	93,2	98,2	95,8	80,5	82,0	100,0	100,0	98,8	91,1	99,1	99,9	98,2	99,1
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,9	0,0	0,4	0,0
Rezisztens (%)	89,9	7,8	8,0	6,6	1,8	4,1	19,5	17,9	0,0	0,0	1,0	8,8	0,0	0,1	1,4	0,9
Törzs (beteg)	12579	19250	15975	14447	17705	6491	20858	20753	13253	8287	5791	10796	336	2019	5617	20388

Fekvőbeteg mintákból izolált törzsek

Érzékeny (%)	7,4	77,0	76,9	77,7	96,9	91,8	71,6	73,5	100,0	99,9	98,0	90,9	99,8	99,9	97,3	98,6
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	-	1,0	-	0,6	0,1	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,6	0,1
Rezisztens (%)	92,6	23,0	23,1	21,3	3,1	7,6	28,3	26,3	0,0	0,1	1,6	8,9	0,0	0,1	2,1	1,3
Törzs (beteg)	10151	14137	10823	11052	14552	6844	15417	15378	10459	6363	7711	9578	493	1632	5182	15061